

## Exposition des 17 et 18 Octobre 2020 à Lachaux 63

|              |                  |                                 |           |  |
|--------------|------------------|---------------------------------|-----------|--|
| AGARICUS     | PORPHYRIZON      | AGARIC PORPHYRE                 | à rejeter | Dans les forêts, les parcs et les jardins, sous feuillus et conifères. |
| AMANITA      | CITRINA          | AMANITE CITRINE                 | à rejeter | Sous feuillus et conifères, sur sol siliceux.                          |
| AMANITA      | PORPHYRIA        | AMANITE PORPHYRE                | à rejeter | Sous feuillus et conifères sur sol acide.                              |
| ARMILLARIA   | MELLEA           | ARMILLAIRE COULEUR DE MIEL      | à rejeter | Surtout sur les feuillus.  |
| BAEOSPORA    | MYOSURA          | COLLIBIE QUEUE-DE-SOURIE        | à rejeter | Sur cônes de pins  |
| BOLETUS      | ERYTHROPUS       | BOLET À PIED ROUGE              | C         | Sous feuillus et conifères sur sols calcaires et siliceux.             |
| BULGARIA     | INQUINANS        | BULGARIE SALISSANTE             | à rejeter | Sur écorce de bois de feuillus (chêne)                                 |
| CALOCERA     | VISCOSA          | CALOCERE VISQUEUSE              | à rejeter | Sur bois mort de conifères (pins etc...).                              |
| CALVATIA     | EXCIPULIFORMIS   | CALVATIE EN COUPE               | à rejeter | Dans les prairies et les champs.                                       |
| CALVATIA     | UTRIFORMIS       | CALVATIE EN OUTRE               | à rejeter | Dans les prairies et les champs.                                       |
| CHROOGOMPHUS | RUTILUS          | GOMPHIDE VISQUEUX               | C         | En forêt sous conifères, surtout pins.                                 |
| CLAVULINA    | CINEREA          | CLAVAIRE CENDREE                | à rejeter | Surtout dans les bois de feuillus.                                     |
| CLAVULINA    | CRISTATA         | CLAVAIRE CRETEE                 | à rejeter |  |
| CLITOCYBE    | CLAVIPES         | CLITOCYBE A PIED EN MASSUE      | à rejeter | Sous feuillus et conifères sur sol acide.                              |
| CLITOCYBE    | NEBULARIS        | CLITOCYBE NEBULEUX              | à rejeter | Sous les feuillus et les conifères.                                    |
| CLITOCYBE    | ODORA            | CLITOCYBE ODORANT, ANISE        | C         | Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout terrain.                 |
| CLITOPILUS   | PRUNULUS         | CLITOPILE PETITE PRUNE, MEUNIER | C         | Dans l'herbe des prés et des forêts sous feuillus et conifères.        |
| COPRINUS     | ATRAMENTARIUS    | COPRIN NOIR D'ENCRE             | T         | Dans l'herbe, en forêt, dans les parcs et les jardins.                 |
| COPRINUS     | COMATUS          | COPRIN CHEVELU                  | C         | Sur terrain gras et au bord des routes.                                |
| CORTINARIUS  | CINNAMOMEOLUTEUS | CORTINAIRE JAUNE CANNELLE       | T         | Sous conifères sur sol acide ou calcaire                               |
| CORTINARIUS  | MUCOSUS          | CORTINAIRE MUQUEUX              | à rejeter | Dans les pinèdes en tout terrain (souvent arénacé et sec).             |
| CORTINARIUS  | PURPURASCENS     | CORTINAIRE POURPRE              | à rejeter | Sous feuillus et conifères en tout terrain (surtout acide) .           |
| CORTINARIUS  | SEMISANGUINEUS   | CORTINAIRE A DEMI SANGUIN       | M         | Sous feuillus et conifères (surtout) sur tout sol.                     |
| CORTINARIUS  | TRIUMPHANS       | CORTINAIRE TRIOMPHANT           | à rejeter | Surtout sous feuillus (bouleaux...) sur sol siliceux.                  |
| CRATERELLUS  | CORNUCOPIOIDES   | TROMPETTE DES MORTS             | C         | Dans les bois, surtout sous hêtres.                                    |
| DAEDALEA     | QUERCINA         | DEDALEE DU CHENE                | à rejeter | Sur bois mort de feuillus (chênes...) .                                |
| DAEDALEOPSIS | CONFRAGOSA       | TRAMETE RUDE                    | à rejeter | Sur bois mort, surtout de feuillus.                                    |
| DAEDALEOPSIS | TRICOLOR         | LENZITE TRICOLERE               | à rejeter | Sur troncs vivants ou morts de feuillus, merisier.                     |
| FISTULINA    | HEPATICATA       | LANGUE DE BOEUF                 | C         | Surtout sur chênes et châtaigniers, morts ou vivants.                  |
| FOMES        | FOMENTARIUS      | AMADOUVIER                      | à rejeter | Sur troncs morts ou vivants, vieux hêtres.                             |
| FOMITOPSIS   | PINICOLA         | POLYPORE DES PINS               | à rejeter | Sur troncs morts, surtout de conifères.                                |
| GANODERMA    | LIPSIENSE        | GANODERME APLANI                | à rejeter | Surtout sur souches et troncs de feuillus.                             |
| GEASTRUM     | TRIPLEX          | GEASTRE A TROIS ENVELOPPES      | à rejeter | Sous feuillus, conifères et dans les landes, surtout sur sol calcaire. |
| GOMPHIDIUS   | GLUTINOSUS       | GOMPHIDE GLUTINEUX              | C         | Sous les pins et les épicéas dans les parcs et en forêt.               |
| GOMPHUS      | CLAVATUS         | CHANTERELLE VIOLETTE            | C         |  |

|                 |                      |                                     |           |   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| GYMNOPIIUS      | PENETRANS            | GYMNOPILE PENETRANT                 | à rejeter | A terre ou sur bois, surtout de conifères.                            |
| GYMNOPIUS       | CONFLUENS            | COLLYBIE EN TOUFFE                  | à rejeter | Fasciculés surtout sur feuilles mortes en forêt.                      |
| GYMNOPIUS       | KUEHNERIANA          | MARASME A PIED ROUGE                | à rejeter | Surtout sur ou sous les feuillus.                                     |
| GYMNOPIUS       | PERONATA             | MARASME GUETRE                      | à rejeter | Sous feuillus et conifères.   |
| HEBELOMA        | CRUSTULINIFORME      | HEBELOME ECHAUDE                    | T         | Sous feuillus et conifères.   |
| HEBELOMA        | RADICOSUM            | HEBELOME RADICANT                   | à rejeter | Sur racines et souches de feuillus (surtout de hêtres) .              |
| HOHENBUEHELIA   | TREMULA              | PLEUROTE TREMULA                    | à rejeter | Bois de conifères   |
| HYDNUM          | REPANDUM             | PIED DE MOUTON                      | C         | Dans les bois de feuillus et de conifères.                            |
| HYGROPHOROPSIS  | AURANTIACA           | FAUSSE GIROLLE                      | C         | Surtout sous les conifères.   |
| HYGROPHORUS     | AGATHOSMUS           | HYGROPHORE A ODEUR AGREABLE         | à rejeter | Sous conifères, surtout sur sol calcaire.                             |
| HYPHOLOMA       | FASCICULARE          | HYPHOLOME EN TOUFFE                 | T         | En touffes sur feuillus et conifères.                                 |
| HYPHOLOMA       | LATERITIUM           | HYPHOLOME COULEUR DE BRIQUE         | T         | En touffes surtout sur souches de feuillus.                           |
| HYPHOLOMA       | MARGINATUM           | HYPHOLOME MARGINE                   | à rejeter | Sur aiguilles, racines et souches de conifères.                       |
| INFUNDIBULICYBE | GEOTROPA             | TÊTE DE MOINE                       | C         | Sous feuillus et conifères, surtout sur sol calcaire.                 |
| INOCYBE         | GEOPHYLLA            | INOCYBE A LAMES TERREUSES VAR LILAS | T         | Sous les feuillus et les conifères.                                   |
| LACCARIA        | AMETHYSTINA          | LACCAIRE AMETHYSTE                  | C         | En forêts, sous feuillus et conifères sur sol acide.                  |
| LACCARIA        | LACCATA              | LACCAIRE LAQUE                      | C         | Sous feuillus et conifères sur sol acide.                             |
| LACTARIUS       | BLENNIUS             | LACTAIRE MUQUEUX                    | à rejeter |   |
| LACTARIUS       | CHRYSORRHEUS         | LACTAIRE À LAIT JAUNE               | à rejeter | Commun sous feuillus sur sol acide (rare sous conifères) .            |
| LACTARIUS       | HEPATICUS            | LACTAIRE HEPATIQUE                  | à rejeter | En plaine sous pins et épicéas sur sol calcaire.                      |
| LACTARIUS       | PIPERATUS            | LACTAIRE POIVRE                     | à rejeter | Surtout sous feuillus et sur sol argilo-calcaire.                     |
| LACTARIUS       | PYROGALUS            | LACTAIRE A LAIT BRULANT             | à rejeter | Sous feuillus (surtout noisetiers) et pins à 5 aiguilles.             |
| LACTARIUS       | RUFUS                | LACTAIRE ROUX                       | à rejeter | Surtout sous conifères sur sol siliceux.                              |
| LACTARIUS       | SALMONICOLOR         | LACTAIRE COULEUR SAUMON             | à rejeter | Sous sapins en plaine et en montagne.                                 |
| LACTARIUS       | VELLERIUS            | LACTAIRE VELOUTE                    | à rejeter | Surtout sous hêtres et châtaigniers.                                  |
| LEPIOTA         | OCHRACEOSULFURESCENS | LEPIOTE JAUNISSANTE                 | T         | Dans les prés, sous feuillus et conifères.                            |
| LEPIOTA         | SUBINCARNATA         | LEPIOTE DE JOSSERAND                | M         | Parcs, jardins.   |
| LEPIOTA         | VENTRIOSOSPORA       | LEPIOTE A BASE COULEUR DE FEU       | T         | Sous feuillus et conifères.   |
| LEPISTA         | INVERSA              | CLITOCYBE INVERSE                   | T         | En ronds de sorcières, sous conifères                                 |
| LEPISTA         | PANAEOLUS            | ARGOUANE                            |           | En cercle dans les prés   |
| LEUCOAGARICUS   | LEUCOTHITES          | LEPIOTE PUDIQUE                     | C         | Surtout dans les prés et les pelouses.                                |
| LEUCOAGARIDUS   | CINARESCENS          | LEPIOTE CENDREE                     | à rejeter |   |
| LYCOPERDON      | PERLATUM             | VESSE DE LOUP PERLEE                | à rejeter | Dans les forêts de feuillus et de conifères.                          |
| LYCOPERDON      | PIRIFORME            | VESSE DE LOUP EN POIRE              | à rejeter | Surtout sur souches pourries de feuillus.                             |
| LYCOPERDON      | UMBRINUM             | VESSE DE LOUP BRUNE                 | à rejeter | Surtout sous conifères, en terrain acide                              |
| MACROLEPIOTA    | KONRADII             | LEPIOTE ETOILEE                     | C         | Dans les prés et les friches (plus rare dans les bois sous feuillus). |

|                 |                   |                             |           |   |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---|
| MACROLEPIOTA    | PROCERA           | COULEMELLE ; LEPIOTE ELEVEE | C         | Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide.              |
| MACROLEPIOTA    | VENENATA          | LEPIOTE VENENEUSE           | T         | Sur sol riche, jardins, parcs                                   |
| MARASMIUS       | ALLIACEUS         | MARASME ALLIACE             | à rejeter | Surtout en montagne sous ou sur les hêtres.                     |
| MARASMIUS       | COHAERENS         | MARASME A PIED CORNE        | à rejeter | Sur feuilles mortes, troncs et souches (feuillus et conifères). |
| MARASMIUS       | OREADES           | MARASME DES OREADES         | C         | Dans l'herbe (rare sous conifères) .                            |
| MELANOLEUCA     | POLIOLEUCA        | MELANOLEUCA A CHAIR BRUNE   | à rejeter | dans les bois de feuillus.                                      |
| MYCENA          | AURANTIOMARGINATA | MYCENE A ARÊTES ORANGE      | à rejeter | Bois de conifères   |
| MYCENA          | EPIPTERYGIA       | MYCENE DES FOUGERES         | à rejeter | Surtout sous les pins sur sol acide.                            |
| MYCENA          | GALERICULATA      | MYCENE CASQUEE              | à rejeter | Sur bois mort, surtout de feuillus.                             |
| MYCENA          | POLYGRAMMA        | MYCENE À PIED STRIE         | à rejeter | Sur souches, surtout de feuillus.                               |
| MYCENA          | PURA              | MYCENE PURE                 | T         | Sous feuillus et conifères, sur tout sol.                       |
| MYCENA          | ROSEA             | MYCENE PURE, FORME ROSE     | T         | Surtout sous les hêtres sur sol calcaire et siliceux.           |
| MYCENA          | ZEPHYRUS          | MYCENE LILAS ROSATRE        | à rejeter | Surtout à terre sous les conifères.                             |
| OLIGOPORUS      | STYPTICUS         | POLYPORE ASTRINGENT         | à rejeter |   |
| PARASOLA        | PLICATILIS        | COPRIN PARASOL              | à rejeter | Pelouses  |
| PAXILLUS        | INVOLUTUS         | PAXILLE ENROULE             | M         | Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide.              |
| PAXILLUS        | PANUOIDES         | PAXILLE EN FORME DE PANUS   | à rejeter | Sur souche ou à la base des conifères (chênes, ...) .           |
| PHELLINUS       | HARTIGII          | POLYPORE DU SAPIN           | à rejeter | Surtout sur troncs de sapins morts ou vivants.                  |
| PHOLIOTA        | APICREA           | PHOLIOTE MIELLEE            | à rejeter | Sous conifères  |
| PHOLIOTA        | ASTRAGALINA       | PHOLIOTE ROUGE BRIQUE       | à rejeter | Sur bois de conifères en montagne.                              |
| PHOLIOTA        | LENTA             | PHOLIOTE GLUANTE            | à rejeter | Surtout sous les hêtres (parfois sur conifères) .               |
| PIPTOPORUS      | BETULINUS         | POLYPORE DU BOULEAU         | à rejeter | Sur troncs et souches, surtout de bouleaux, morts ou vivants.   |
| PLUTEUS         | CERVINUS          | PLUTEE COULEUR DE CERF      | à rejeter | Sur bois pourri, surtout de feuillus.                           |
| POLYPORUS       | BADIUS            | POLYPORE BAIE               | à rejeter | Surtout sur bois mort de feuillus.                              |
| POSTIA          | PTYCHOGASTER      | POLYPORE EN COUSSINET       | à rejeter | Sur bois pourri de conifères (sapins, épicéas, ...) .           |
| PSATHYRELLA     | PILULIFORMIS      | PSATHYRELLE HYDROPHILE      | à rejeter | En touffes sur souches de feuillus (surtout) et de pins.        |
| PSEUDOCLITOCYBE | CYATHIFORMIS      | CLITOCYBE EN COUPE          | à rejeter | En forêt, sous feuillus et conifères.                           |
| RAMARIA         | PALLIDA           | RAMAIRE PALE                | T         | Surtout sous conifères sur sol calcaire.                        |
| RHODOCOLLYBIA   | BUTYRACEA         | COLLYBIE BEURREE            | à rejeter | Sous feuillus et conifères.                                     |
| RHODOCOLLYBIA   | DISTORTA          | COLLYBIE A PIED TORDU       | à rejeter | Surtout sous conifères sur sol siliceux.                        |
| RUSSULA         | BADIA             | RUSSULE PERFIDE             | à rejeter | Sous les conifères surtout en montagne sur sol siliceux.        |
| RUSSULA         | DELICA            | RUSSULE SANS LAIT           | à rejeter | Sous feuillus et conifères sur sol calcaire.                    |
| RUSSULA         | FRAGILIS          | RUSSULE FRAGILE             | à rejeter | Sous les feuillus et les conifères.                             |
| RUSSULA         | INTEGRA           | RUSSULE INTEGRE             | C         | Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).     |
| RUSSULA         | MUSTELINA         | RUSSULE BELETTE             | C         |   |
| RUSSULA         | NIGRICANS         | RUSSULE NOIRCISSANTE        | à rejeter | Sous les feuillus et les conifères.                             |

|                |                 |                            |           |  |
|----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|
| RUSSULA        | PARAZUREA       | RUSSULE PRESQUE BLEUE      | à rejeter | Surtout sous les feuillus sur sol argileux ou acide.   |
| RUSSULA        | PUELLARIS       | RUSSULE JEUNE FILLE        | à rejeter | Sous feuillus et conifères, surtout sur sol siliceux.  |
| SARCODON       | IMBRICATUS      | HYDNE IMBRIQUE             | C         | Dans les bois, surtout de conifères.                   |
| SPARASSIS      | BREVIPES        | SPARASSIS LAMELLEUX        | C         | A terre, surtout à la base des chênes.                 |
| SPARASSIS      | CRISPA          | SPARASSIS CREPU            | C         | Sur ou près des souches de conifères, surtout pins.    |
| STEREUM        | HIRSUTUM        | STEREE HIRSUTE             | à rejeter | Surtout sur feuillus, morts ou vivants.                |
| SUILLUS        | GRANULATUS      | BOLET GRANULE              | à rejeter | Sous les pins dans les bois et les parcs.              |
| SUILLUS        | LUTEUS          | NONETTE VOILEE             | C         | Sous les pins sur sol sablonneux.                      |
| TREMELLA       | MESENERICA      | TREMELLE MESENERIQUE       | à rejeter | Sur branches mortes tombées de feuillus.               |
| TRICHOLOMA     | PSEUDONICTITANS | TRICHOLOME LUISANT         | à rejeter | Surtout sous les conifères.                            |
| TRICHOLOMA     | STANS           | TRICHOLOME ELANCE          | à rejeter | Sous les conifères.                                    |
| TRICHOLOMA     | USTALE          | TRICHOLOME BRULE           | à rejeter | Sous les feuillus, surtout en plaine sur sol calcaire. |
| TRICHOLOMOPSIS | RUTILANS        | TRICHOLOME RUTILANT        | à rejeter | Sur souches et racines de conifères.                   |
| VASCELLUM      | PRATENSE        | VESSE DE LOUP A DIAPHRAGME | à rejeter | Parmi l'herbe des pelouses et des prairies.            |
| XYLARIA        | HYPOXYLON       | XYLAIRE DU BOIS            | à rejeter | Sur bois pourrissants de feuillus.                     |