

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Recommandations et mise en œuvre de la destruction du nid primaire



Début 2024 un **Plan National de lutte contre le Frelon Asiatique à pattes jaunes** a été élaboré par GDS France et FREDON France avec l'appui du Ministère de l'Agriculture (MASA) et du Ministère de la Transition Ecologique (MTECT).

Ce plan doit répondre à 3 enjeux majeurs vis-à-vis du frelon asiatique : la protection des ruchers, de la biodiversité et de la population en adaptant les moyens de lutte (piégeage, destruction des nids, réduction du stress des ruchers) suivant le niveau d'infestation du territoire par le frelon.

L'organisation est concertée à l'échelle départementale au sein d'un Comité de Pilotage (FDGDON, GDSA et organisations d'apiculteurs, collectivités, etc.....) Dans le Morbihan, ce comité existe depuis 2015. Ses préconisations pour lutter contre le frelon asiatique se sont adaptées cette année pour tenir compte des orientations fixées par le plan national.

Le nid primaire est le premier nid réalisé au printemps (avril à juin) par les fondatrices sortant d'hivernation. Celles-ci ébauchent un nouveau nid, très souvent proche d'habitations et à l'abri (cabanon, auvent, coffrets de volets roulants, hangar...).

Elles y pondent quelques œufs et soignent leurs premières larves qui deviendront les ouvrières adultes un mois et demi plus tard.

Le nid primaire a une forme sphérique et a une taille allant d'une balle de ping-pong à une balle de tennis, avec une ouverture unique en dessous.



↳ **Pourquoi rechercher et détruire les nids primaires ?**

Il est primordial de rechercher et de détruire le maximum de nids primaires car un nid primaire non détruit engendra un nid secondaire (été), plus volumineux, plus dangereux pour l'homme, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Un nid secondaire est également plus coûteux à détruire.

A noter : un nid de frelons asiatiques sur toute la saison peut consommer entre 11 et 15 kg d'insectes !

.../...

↳ Comment repérer et détruire les nids primaires ?

Afin de repérer un maximum de nids primaires, il est conseillé de bien observer ses abris de jardins, avancées de toits... durant la période d'avril/mai.

Dès que vous repérez un nid primaire, rien ne sert de se précipiter car il faut s'assurer que la reine soit présente dans son nid pour le détruire.

Elle est généralement présente dans le nid tôt le matin ou le soir, qui sont donc les meilleurs moments pour intervenir avec efficacité.

Par conséquent toute destruction dans la journée, en l'absence de la reine est inutile. Celle-ci reconstruirait très rapidement un nouveau nid primaire.

La destruction peut se faire :

- En écrasant le nid et la reine avec un objet plat ;
- A l'aide d'un bocal et d'une spatule en le décrochant rapidement ;
- Il est également possible d'utiliser un insecticide.

Vous souhaitez participer à la lutte contre le frelon asiatique sur votre territoire ? il est indispensable de **respecter scrupuleusement toutes ces préconisations.**

Besoin d'info, une question ?

>>> contactez le référent frelon de votre commune ou la FDGDON 56