

A la recherche de la
RAINETTE VERTE

Hyla arborea

La commune de Corcoué-sur-Logne
et le CPIE Logne et Grand-Lieu
vous invitent à rechercher les
Rainettes vertes présentes
sur votre commune.

Photo : E. Lagadeo



Atlas de la Biodiversité Communale



Avec le soutien financier de





Ses caractéristiques

La Rainette verte a la peau... verte pomme et lisse. Elle présente une bande brune partant de l'œil, passant par le tympan et finissant au niveau des pattes postérieures. Ses pattes avant plus courtes sont composées de 4 doigts et les pattes arrières plus longues sont composées de 5 doigts. Le bout de ses doigts comportent des pelotes adhésives.



Photo : Pixabay



Photo : CPIE Logne et Grand-Lieu



Son écologie

La Rainette verte vit dans des zones de végétations denses dans lesquelles elle peut se cacher. Elle vit près des lacs, mares, étangs temporaires, prairies humides, ou encore en lisière de forêt où elle va se nourrir essentiellement d'insectes. Au printemps, elle pond dans l'eau des petits amas de 800 à 1000 œufs. Vers juillet - août, les têtards vont se métamorphoser vers leur forme adulte et quitter le milieu aquatique.



Risques de confusion

La Rainette verte peut-être facilement confondue avec une autre Rainette plus méridionale... la Rainette méridionale (photo ci-contre). Chez la Rainette méridionale, les bandes brunes ne sont pas aussi longues que celles de la Rainette verte. Celles-ci s'arrêtent au-dessus de la patte antérieure.



Photo : O. Delzons

Le saviez-vous ?

Le mot "amphibien" vient du grec "amphi" et "bios".

Cela veut dire "double" "vie".

Faisant référence à la phase aquatique des têtards et terrestre des adultes.



Vous avez observé la Rainette verte sur Corcoué-sur-Logne ?

Faites remonter vos observations à l'adresse suivante :

abc@mairiecorcoue.fr

dans le formulaire en ligne sur le site de la ville.

