

GENRE	ESPECE	var. ou f.	habitat	comestibilité
AGARICUS	ESSETTEI		Sous les pins et les sapins (rare sous feuillus) .	C
AGARICUS	LANGEI		En groupe surtout dans les bois de pins et d'épicéas.	à rejeter
AGARICUS	XANTHODERMUS		Dans les prés les bois et les parcs.	T
AGARICUS	CAMPESTRIS		Dans les prés pâturés et les jardins.	C
ALEURIA	AURANTIA		A terre sur sol argilo-sableux.	C
AMANITA	SUBMEMBRANACEA		sapinières de montagne.	à rejeter
AMANITA	EXCELSA	var. spissa	Sous les feuillus et les conifères.	à rejeter
AMANITA	FULVA		Surtout sous feuillus sur sol siliceux.	à rejeter
AMANITA	JUNQUILLEA		Sous les feuillus et les conifères.	T
AMANITA	PANTHERINA		Surtout sous les feuillus, en plaine et en montagne.	T
AMANITA	RUBESCENS		Sous feuillus et conifères, en tout terrain.	à rejeter
AMANITA	MUSCARIA		Surtout sous conifères et bouleaux sur sol acide.	T
ARMILLARIA	MELLEA		Surtout sur les feuillus.	à rejeter
ARMILLARIA	OSTOYAE		Surtout sur conifères.	à rejeter
BOLETUS	ERYTHROPUS		Sous feuillus et conifères sur sols calcaires et siliceux.	C
BOLETUS	RADICANS		Sous feuillus, surtout sous les chênes	T
BOLETUS	EDULIS		Sous les feuillus et les conifères.	C
CALOCERA	VISCOSA		Sur bois mort de conifères (pins etc...).	à rejeter
CANTHARELLUS	AMETHYSTEUS		Surtout sous les feuillus et les conifères de montagne.	C
CHALCIPORUS	PIPERATUS		Sous conifères et feuillus, sur tout sol.	à rejeter
CHLOROPHYLLUM	RHACODES		Sous feuillus et sous conifères.	C
CHROOGOMPHUS	RUTILUS		En forêt sous conifères, surtout pins.	C
CHRYSOMPHALINA	CHRYSOPHYLLA		sur branches de résineux.	à rejeter
CLAVARIADELPHUS	PISTILLARIS		Surtout sous chênes et hêtres sur sol calcaire.	à rejeter
CLITOCYBE	CLAVIPES		Sous feuillus et conifères sur sol acide.	à rejeter
CLITOCYBE	NEBULARIS		Sous les feuillus et les conifères.	à rejeter
CLITOCYBE	ODORA		Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout terrain.	C
CLITOCYBE	PHYLLOPHILA		Sous feuillus.	à rejeter
CLITOPILUS	PRUNULUS		Dans l'herbe des prés et des forêts sous feuillus et conifères.	C
COPRINUS	ATRAMENTARIUS		Dans l'herbe, en forêt, dans les parcs et les jardins.	T
CORTINARIUS	VARIUS		Surtout sous épicéas, plutôt sur sol calcaire	à rejeter
CRATERELLUS	TUBIIFORMIS		Sous résineux de montagne,	C
CYSTODERMA	AMIANTHINUM		Sous feuillus et conifères sur tout sol (surtout moussu) .	à rejeter
CYSTODERMA	GRANULOSUM		Dans les mousses des prairies et les bois de conifères	à rejeter
ENTOLOMA	NIDOROSUM		Sous feuillus et conifères, surtout sur sol argileux.	à rejeter
FOMITOPSIS	PINICOLA		Sur troncs morts, surtout de conifères.	à rejeter
GEASTRUM	TRIPLEX		Sous feuillus, conifères et dans les landes, surtout sur sol calcaire.	à rejeter
GLOEOPHYLLUM	ABIETINUM		Sur bois de conifères (surtout épicéas) .	à rejeter
GOMPHIDIUS	GLUTINOSUS		Sous les pins et les épicéas dans les parcs et en forêt.	C
GYMNOPIUS	PENETRANS		A terre ou sur bois, surtout de conifères.	à rejeter
GYROMITRA	INFULA		Sous conifères de montagne en automne	M
HOHENBUEHELIA	GEOGENIA		Sur les bois enfouis et des débris ligneux de feuillus	à rejeter
HYDNUM	REPANDUM		Dans les bois de feuillus et de conifères.	C
HYGROCYPE	CONICA		Dans l'herbe des prairies sèches.	à rejeter
HYGROPHOROPSIS	AURANTIACA		Surtout sous les conifères.	C
HYGROPHORUS	AGATHOSMUS		Sous conifères, surtout sur sol calcaire.	à rejeter
HYGROPHORUS	PUDORINUS		Sous conifères, surtout en montagne sur sol calcaire.	à rejeter
HYPHOLOMA	FASCICULARE		En touffes sur feuillus et conifères.	T
INFUNDIBULICYBE	GIBBA		Sous feuillus et conifères en tout terrain.	à rejeter
INOCYBE	CALAMISTRATA		Sous les conifères et les feuillus.	T
ISCHNODERMA	BENZOINUM		Sur bois mort ou vivant, surtout de conifères.	à rejeter
KUEHNEROMYCES	MUTABILIS		En touffes sur souches ou bois mort.	C
LACCARIA	AMETHYSTINA		En forêts, sous feuillus et conifères sur sol acide.	C
LACCARIA	LACCATA		Sous feuillus et conifères sur sol acide.	C
LACTARIUS	PYROGALUS		Sous feuillus (surtout noisetiers) et pins à 5 aiguilles.	à rejeter
LACTARIUS	TORMINOSUS		Surtout sous bouleaux sur sol siliceux.	à rejeter
LACTARIUS	CONTRORSUS		Sous les feuillus, surtout sous peupliers et saules.	à rejeter
LACTARIUS	SALMONICOLOR		Sous sapins en plaine et en montagne.	à rejeter
LACTARIUS	DETERRIMUS		Sous les épicéas.	C
LACTARIUS	BLENNIUS		sous les hêtres uniquement.	à rejeter
LACTARIUS	NECATOR		Surtout sous les bouleaux, les charmes et les épicéas.	à rejeter
LACTARIUS	PUBESCENS		Sous bouleaux dans les tourbières.	à rejeter
LACTARIUS	SEMISANGUIFLOUS		Sous les pins sur sol calcaire, surtout dans le sud.	C
LECCINUM	ALBOSTIPITATUM		Sous trembles, bouleaux et peupliers.	C
LECCINUM	VERSIPELLE		Sous feuillus en plaine et sous conifères en montagne.	C
LEPIOTA	IGNIVOLVATA		Sous conifères (surtout) et feuillus sur sol calcaire.	T
LEPIOTA	OCHRACEOSULFURESCENS		Dans les prés, sous feuillus et conifères.	T
LEPISTA	INVERSA		En ronds de sorcières, sous conifères	T
LEUCOAGARICUS	LEUCOTHITES		Surtout dans les prés et les pelouses.	C
LIMACELLA	ILLINITA		Surtout sous les conifères.	à rejeter
LIMACELLA	GUTTATA		Surtout sous conifères et hêtres.	à rejeter
LYCOPERDON	NIGRESCENS		Surtout sous conifères, en terrain acide	à rejeter
LYCOPERDON	PERLATUM		Dans les forêts de feuillus et de conifères.	à rejeter
MACROLEPIOTA	PROCERA		Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide.	C
MACROLEPIOTA	RHACODES		Dans les taillis, les bois, souvent sous conifères	à rejeter
MARASMIUS	ALLIACEUS		Surtout en montagne sous ou sur les hêtres.	à rejeter
MUCIDULA	MUCIDA		Sur troncs et branches, surtout de hêtres.	à rejeter
MYCENA	PELIANTHINA		sous feuillus sur sol calcaire	à rejeter
MYCENA	ROSEA		Surtout sous les hêtres sur sol calcaire et siliceux.	T
OLIGOPORUS	CAESIUS		Sur bois pourri, surtout de conifères.	à rejeter
OUDEMANSIELLA	RADICATA		Sur souches pourries ou sur racines enfouies de hêtres	à rejeter
PAXILLUS	INVOLUTUS		Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide.	M
PHOLIOTA	SQUARROSA		Cespiteux sur feuillus et conifères.	à rejeter
PLUTEUS	CERVINUS		Sur bois pourri, surtout de feuillus.	à rejeter
RUSSULA	CAVIPES		Dans les pessières humides sur sol calcaire.	à rejeter
RUSSULA	AMETHYSTINA		Sous sapins, épicéas et pins, surtout en montagne.	à rejeter
RUSSULA	MUSTELINA		Sous conifères de montagne.	C
RUSSULA	CYANOXANTHA		Sous les feuillus et les conifères.	C
RUSSULA	QUELETII		Surtout sous épicéas en montagne sur tout sol.	à rejeter
RUSSULA	FAGETICOLA		Surtout sous les hêtres.	à rejeter
RUSSULA	OCHROLEUCA		Sous les feuillus et les conifères.	à rejeter
RUSSULA	BADIA		Sous les conifères surtout en montagne sur sol siliceux.	à rejeter
RUSSULA	DELICA		Sous feuillus et conifères sur sol calcaire.	à rejeter
RUSSULA	DRIMEIA		Dans les pinèdes sablonneuses, en plaine.	à rejeter
RUSSULA	AERUGINEA		Sous bouleaux, pins et épicéas.	à rejeter
SARCODON	IMBRICATUS		Dans les bois, surtout de conifères.	C
SCUTIGER	CRISTATUS		A terre, surtout sous épicéas et chênes.	à rejeter
SPARASSIS	CRISPA		Sur ou près des souches de conifères, surtout pins.	C
SPATHULARIA	FLAVIDA		A terre parmi les aiguilles de conifères en montagne.	à rejeter
STEREUM	HIRSUTUM		Surtout sur feuillus, morts ou vivants.	à rejeter
STROPHARIA	CAERULEA		Surtout sous hêtres sur sol calcaire.	T
STROPHARIA	AERUGINOSA		A terre dans les forêts et les parcs.	T
SUILLUS	GREVILLEI		Sous les mélèzes (rare sous épicéas) .	à rejeter
SUILLUS	GRANULATUS		Sous les pins dans les bois et les parcs.	à rejeter



SUILLUS	VARIEGATUS		Dans les bois de pins sur sol acide.	à rejeter
SUILLUS	LUTEUS		Sous les pins sur sol sablonneux.	C
TRICHOLOMA	SAPONACEUM		Dans les bois de feuillus (chênes surtout) et de conifères.	à rejeter
TRICHOLOMA	SAPONACEUM	var. SQUAMOSUM	Forme à chapeau et pied bleu noirâtre ou gris ardoise.	à rejeter
TRICHOLOMA	ALBUM		Surtout sous feuillus sur sol sablonneux.	à rejeter
TRICHOLOMA	COLUMBETTA		Sous feuillus et conifères sur sol acide.	à rejeter
TRICHOLOMA	EQUESTRE		Sous les feuillus et les conifères.	M
TRICHOLOMA	PSEUDONICTITANS		Surtout sous les conifères.	à rejeter
TRICHOLOMA	PORTENTOSUM		Surtout sous conifères sur sol acide.	C
TRICHOLOMA	SULFUREUM		Surtout sous feuillus sur sol acide.	à rejeter
TRICHOLOMOPSIS	DECORA		Sur souches et brindilles de conifères.	à rejeter
TRICHOLOMOPSIS	RUTILANS		Sur souches et racines de conifères.	à rejeter
XEROCOMUS	CHRYSETERON		Sous feuillus et conifères de plaine.	à rejeter
XEROCOMUS	BADIUS		Sous feuillus et conifères sur sol acide.	C
XEROCOMUS	FERRUGINEUS		Sous feuillus et conifères.	à rejeter
XEROCOMUS	PRUINATUS		Sous feuillus et conifères de montagne.	à rejeter
XYLARIA	HYPOXYLON		Sur bois pourrissants de feuillus.	à rejeter