

Agissons tous dès aujourd'hui

Luttons contre l'Ambroisie

Surveiller

les zones à risques

- les cultures et leurs abords ;
- les espaces ouverts :
 - * talus routiers, ferroviaires...,
 - * chantiers,
 - * berges de cours d'eau,
 - * friches industrielles,
 - * terrains vagues,
- les points de nourrissage des oiseaux dans les jardins (les mélanges de graines contiennent souvent des semences d'Ambroisie).

Détruire

l'Ambroisie avant sa floraison

- par :
- l'arrachage ;
 - le fauchage (à répéter si besoin) ;
 - la mise en sac poubelle ou l'incinération des plantes fauchées ou arrachées (en respectant les obligations légales).

Lors de la manipulation de la plante, porter toujours des gants et des vêtements longs qui couvrent tout le corps (et un masque en période de pollinisation).

Nous signaler

la présence de l'Ambroisie

- en remplissant le formulaire en ligne <http://cbnfc.org/ambroisie> ;
- en écrivant au *Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - maison de l'environnement de Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000 Besançon.*

S'informer

<http://cbnfc.org/ambroisie>
<http://www.franche.comte.sante.gouv.fr>
<http://ambroisie.info>
<http://pollens.fr>
<http://assoc.orange.fr/afeda>
<http://www.rhone.fr/ambroisie>

Contenir l'impact de l'Ambroisie à un niveau supportable nécessite l'implication de tous.



Réalisation : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, 2008
Illustrations : CBNFC, Bailly G., Hennequin C. et INRA-UMR. BGA Dijon

Agissons tous

Franche-Comté

AMBROISIE DANGER

Graves allergies


De multiples nuisances

Comment reconnaître l'Ambroisie ?



un danger pour la santé

En libérant son pollen très allergisant qui provoque en fin d'été :



Fleurs

vert pâle à jaunes
en épis dressés

Feuilles

très découpées
vertes des deux
côtés

Hauteur

de 0,20 à 2 mètres

Aspect

buisonnant



Germination

avril-mai

deux cotylédons,
puis deux feuilles
opposées
et découpées



Croissance

juin-juillet

de la plantule à une plante adulte à port buissonnant



une menace pour la biodiversité

En envahissant les sols nus,
elle concurrence nos espèces sauvages locales.

Risque de confusion avec l'Armoise vulgaire



Ambrosie



Armoise

Couleur	Deux faces vert clair	Face inférieure blanchâtre
Forme	Profondément divisée jusqu'à la nervure	Divisée mais sans aller jusqu'à la nervure
Odeur (à l'état frais)	Pas d'odeur quand on la froisse	Odeur marquée quand on la froisse

Floraison

août-septembre

période où la plante est très allergisante



une nuisance pour l'agriculture

En se mélangeant aux cultures, elle :
- réduit les rendements des récoltes ;
- diminue leur qualité.

Fructification

septembre-octobre

la plante sèche,
les graines tombent
au sol

