

Leucoagaricus badhamii (Bk.-Br.)Sing.


Contrôle : Capelli M. 15/10/1999

CLASSEMENT :

Genre: LEUCOAGARICUS
 Section: PILOSELLI
 S/Section: PILOSELLI
 Groupe:
 Espèce: BADHAMII
 Variété:
 Forme:
 synonyme: L.rufovelutina
 appellation: Lépiote de Badham

INFORMATIONS :

Archive: Groupe myco Cournon 63 Exsiccata: non
 N° de l'exemplaire:
 date de l'observation: 15/10/99
 commune: le breuil sur couze
 lieu-dit: bois du roi
 habitat: taillis mêlés (feuillus résineux)
 type de terrain: sableux recouvert de lierre
 exposition: bord allier
 dep: 63 altitude: 350m
 rep cartographique: 2633A

DESSIN**CARACTERISTIQUES MACROSCOPIQUES :****Chapeau:**

dimension max (cm): 5 consistance:
 forme: convexe, peu mamelonné
 marge:
 aspect cuticule: veloute, squameux
 couleur cuticule: blanc à squames brunes
 séparabilité cuticule:
 couleur sous-cuticule:

Lame:

consistance:
 insertion: sulcollariée forme:
 couleur: blanche
 autre:

Sporée:

couleur: blanche

Stipe:

dimensions (cm): 10x1 aspect surface: fibrilleux
 forme: base clavée aspect interne:
 couleur: blanc ornementation: anneau simple

Chair:

consistance: odeur: faible
 saveur: douce
 couleur: blanche à rougissement vif puis noircissant

Réact. macrochimiq. : NH3=vert vif

CARACTERISTIQUES MICROSCOPIQUES :**1.Spore:**

dimensions (µm) : 8x5 forme: subovoïde à sommet ogival
 chimie: ornementation: lisse

2.Baside:

dimensions (µm) : 20x10 forme: clavée non bouclée

3.Cheilocystide:

dimensions (µm) : 50x18x5 forme: lagéniforme à col étranglé

4.Pleurocystide:

dimensions (µm) : forme:

5.Cuticule:

surface pileïque: trichoderme typique à poils fusiformes(200x12)
boucles nulles

6.Autre:

References : M.Bon ;DM Hors série N°3 page 103

0 ≈ 1cm

5

10

15